

# NPVA™をご使用するにあたっての注意事項

- 使用中にチクチクと痛みが伴います。部位や代謝により個人差がありますが、約 12 時間～ 24 時間程度、使用か所にチクチク感が続きます。
- 使用直後～ 3 日以内にマイクロニードルの刺激による反応（痛み、赤み、腫れ、痒み等）が生じた場合、氷水などで冷やしてください。  
推奨：マジックスージングジェル（沈静）
- 使用翌日～ 7 日以内にビタミン A による A 反応（痛み、赤み、ひりつき、痒み、腫れ、剥離等）が生じた場合、しっかり保湿と紫外線ケアを行ってください。
- 使用前後はしっかり保湿することが重要です。使用后 1-2 週間程度は乾燥しやすい状態が続きますので、こまめにクリームを塗りなおすなどしてしっかり保湿してください。推奨：モイスチャークロークリーム（再生）（スキンケア時・就寝前）
- 腫れや赤み、剥離が出ている場合は特にしっかり保湿してください。使用を詰めて行っている場合や、NPVA2 以上の使用はより強く出ます。推奨：ナリッシングオー（治癒）
- ビタミン A 系（レチノール）の基礎化粧品との併用はお控えください。
- 使用当日は水分をしっかり補給してください。
- 使用当日は飲酒・入浴・過度な運動は避けていただきシャワー浴をお勧めします。特に敏感肌の方は厳守してください。
- 使用后 3 日間は雑菌の付着しやすいサウナ・プール・海水浴・公衆浴場のご利用はお避けください。
- 使用后 3 日間は特にしっかり日焼け止めをご使用ください。
- 3-6 種類の高濃度ビタミン A が配合されている為、敏感肌の方や角質が積っている方や使用を詰めて行っている場合には、薄皮が剥離することがございます。無理にこすったりはがしたりせず自然に剥離するようにしてください。
- 当日のメイクは炎症や腫れが生じていない場合は可能ですが、しない方がより効果的です。

## ダウンタイムについて

- \* 基本的にはありません。
- \* 痛み・赤み・腫れ・痒み・ひりつき・剥離・・・使用直後～ 7 日程度  
この症状が起きている場合、次回の使用は赤みが引き始めてから行ってください。  
ダウンタイムの経過については個人差が大きいです。次回の使用の参考になりますのでご自身で経過をご確認お願いいたします。

※NPVA™に関する知的財産権は株式会社マレセットに帰属し、株式会社アイセルが独占の実施または使用許諾を受けています。

---

## 承 諾 書

NPVA™を使用するにあたり、上記カウンセリング、注意事項、内容を十分に理解・納得した上で申し込みいたします。

年 月 日

ご署名

---